




おおきくなあれ



予防接種へ行く前のチェック

1. お子さんの体調はよいですか。
2. 今日受ける予防接種について、必要性・効果及び副反応など理解していますか。わからないことがあれば、質問をメモにしておきましょう。
3. 母子健康手帳は持ちましたか。
4. 予診票、体温表（小学生以下の場合）の記入は済みましたか。
5. 希望する予防接種の予約はしてありますか。

定期予防接種（乳幼児）の対象年齢

| 対象疾病 | ワクチン | 期間 | 間隔・回数 | 場所 |
|--|---|---|---|-----------------------|
| 結核 | BCGワクチン | 生後5か月～1歳に至るまでの間 | 1回 | 町指定 医療機関 (個別接種) |
| B型肝炎 | 組換え沈降B型肝炎ワクチン | 生後2か月～1歳に至るまでの間 | 27日以上の間隔をおいて2回、初回接種後139日以上の間隔をおいて1回、計3回 | |
| 小児の肺炎球菌感染症 | 沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン | 1期初回：生後2か月～5歳未満 | 27日以上の間隔で3回 | |
| | | 1期追加：生後2か月～5歳未満 | 1期初回（3回）接種終了後60日以上の間隔をあけて1回 | |
| ヒブ感染症 | 乾燥ヘモフィルスb型ワクチン | 1期初回：生後2か月～5歳未満 | 27日以上の間隔で3回 | |
| | | 1期追加：生後2か月～5歳未満 | 1期初回（3回）接種終了後7か月以上の間隔をあけて1回 | |
| ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎（ポリオ） | 四種混合ワクチン（DPT-IPV） 沈降精製百日せき ジフテリア破傷風 不活化ポリオ混合ワクチン | 1期初回：生後2か月～7歳半未満 | 20日以上の間隔で3回 | |
| | | 1期追加：生後2か月～7歳半未満 | 1期初回（3回）接種終了後6か月～1年半の間に1回 | |
| ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎（ポリオ） ヒブ感染症 | 五種混合ワクチン（DPT-IPV+Hib） 沈降精製百日せき ジフテリア破傷風 不活化ポリオ混合 乾燥ヘモフィルスb型 ワクチン | 1期初回：生後2か月～7歳半未満 | 20日以上の間隔で3回 | |
| | | 1期追加：生後2か月～7歳半未満 | 1期初回（3回）接種終了後6か月～1年半の間に1回 | |
| 麻しん 風しん | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン（MR）または 乾燥弱毒生麻しんワクチンまたは 乾燥弱毒生風しんワクチン | 1期：1歳～2歳未満 (1歳をむかえたらなるべく早めに済ませてください) | 1回 | |
| | | 2期：5歳～7歳未満で 小学校就学前1年間 (いわゆる年長児期) | 1回 | |
| 水痘 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン | 1歳～3歳未満 | 3か月以上の間隔で2回 (標準的には6～12か月の間隔) | |

| 対象疾病 | ワクチン | 期間 | 間隔・回数 | 場所 |
|----------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------|
| 日本脳炎 | 乾燥細胞培養 日本脳炎 ワクチン | 1 期初回：3 歳～7 歳未満 | 6 日以上の間隔で 2 回 | 町指定 医療機関 (個別接種) |
| | | 1 期追加：3 歳～7 歳未満 | 1 期初回終了後 6 か月以上あけて 1 回(標準的には 1 年あけて 1 回) | |
| | | 第 2 期：9 歳～13 歳未満 | 1 回 | |
| ジフテリア 破傷風混合 | 二種混合ワクチン (DT) 沈降ジフテリア 破傷風混合トキソイド | 第 2 期：11 歳以上 13 歳未満 (小学校 6 年生で接種) | 1 回 | |
| ロタウイル ス感染症 | 経口弱毒生ヒトロタ ウイルスワクチン | 出生 6 週 0 日後～24 週 0 日後 | 27 日以上の間隔を置いて 2 回 | |
| | 五価経口弱毒生ロタ ウイルスワクチン | 出生 6 週 0 日後～32 週 0 日後 | 27 日以上の間隔を置いて 3 回 | |


| 対象疾病 | ワクチン | 対象年齢 | 標準的な接種間隔 | | | 自己負担額 |
|------------------------|----------------------|--|----------|---------------------------------|--|----------------|
| | | | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | |
| ヒトパピロ ーマウイル ス感染症 | 2 価ワクチン (サーバリックス) | 中学 1 年生～高 校 1 年生の女子 | 1 回 | 標準的には 1 か月以 上の間隔をおいた後 1 回 | 1 回目から 5 か月以上 の間隔、かつ 2 回目か ら 2 か月半以上の間 隔をおいた後 1 回 | 1 回 1,000 円 |
| | 4 価ワクチン (ガーダシル) | | | | | |
| | 9 価ワクチン (シルガード 9) | 中学 1 年生～高校 1 年生の女子 (1 回目の接種を 15 歳になるまで に受ける場合) | 1 回 | 標準的には 1 か月以 上の間隔をおいた後 1 回 | | |
| | | 中学 1 年生～高校 1 年生の女子 (1 回目の接種を 15 歳になってか ら受ける場合) | 1 回 | 標準的には 1 か月以 上の間隔をおいた後 1 回 | 1 回目から 5 か月以上 の間隔、かつ 2 回目か ら 2 か月半以上の間 隔をおいた後 1 回 | |

※詳しくは、「予防接種とこどもの健康」をご覧ください。


※接種間隔は医師の指示に従ってください。



違う種類のワクチンを接種する場合の間隔



(生ワクチン(注射)を接種した日の翌日から、別の種類の生ワクチン(注射)を行う日までの間隔は、27 日以上、別の不活化ワクチンを行う日までの間隔は 1 日以上おく。)



異なった種類のワクチンを特に急いで接種する必要がある場合は、医師にご相談ください。
なお、同じ種類のワクチンを複数回接種する場合には、それぞれに定められた間隔がありますので、誤らないようにしてください。

医療機関で個別接種するとき

| 医療機関名 | 住所 | 電話番号 | 予約受付時間 |
|------------------|------------------|---------|--|
| 安八診療所 | 安八町南今ヶ淵 270-2 | 64-3616 | 午前8時30分～12時 午後4時～6時 水・土曜日午後休診 日曜日・祝日休診 |
| 吉田医院 | 安八町城1-6 | 64-3800 | 午前8時30分～12時 午後4時30分～7時 土曜日午後休診 木・日曜日・祝日休診 |
| 岩田内科 クリニック | 安八町森部 1383-1 | 63-0038 | 午前8時30分～12時 午後4時30分～7時 木・土曜日午後休診 日曜日・祝日休診 |
| 石田医院 | 安八町水取 739 | 64-2012 | 午前9時～12時 午後4時～6時 土曜日午後休診 木・日曜日・祝日休診 |
| おおくま内科 クリニック | 安八町東結 1520-1 | 61-1215 | 午前9時～12時 午後4時～7時 水・土曜日午後休診 日曜日・祝日休診 |
| 山中ジェネラル クリニック | 安八町森部 1870-1 | 63-2333 | 午前8時30分～12時30分 午後4時～7時 木・土曜日午後休診 日曜日・祝日休診 |

- ① 4日前までに医療機関へ電話予約してください。(接種希望のワクチンを伝える)
※上記以外でも接種できます。上記以外の医療機関をご希望の方は、保健センターへ必ずご連絡ください
- ② 当日、自宅でお子さんの体調の良いことを確認し、予診票を記入してください。
体調が悪い時は予約取り消しの電話をしましょう。
- ③ 医療機関へ予診票、母子健康手帳、体温表、自己負担金(ヒトパピローマ 1,000円)をお持ちください。
※令和6年度より、ヒブ・小児肺炎球菌ワクチンの自己負担金がなくなりました。
- ④ 接種後、30分程はその場で様子を見てください。2～3週間くらいは副反応の出現に注意し、気になる症状があれば受診しましょう。

予防接種の接種期間について

※接種期間開始は、誕生日の前日から接種可能です

例えば5月3日の誕生日の場合は、5月2日から接種可能です

| | | |
|------|------|------|
| 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 |
| | 前日 | 誕生日 |

※接種期間終了は、誕生日の前日までに済ませます

例えば5月3日の誕生日の場合は、5月2日までに接種を済ませます

| | | |
|------|------|------|
| 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 |
| | 前日 | 誕生日 |

↑
接種はここまで



令和7年度 おたふくかぜ予防接種の助成について

1. 対象者 1～5歳の児（6歳の誕生日の前日まで）
2. 助成額 2,500円
3. 申請方法 ご希望の医療機関にて実費で接種した後、保健センターへ1か月以内に申請してください。

＜持ち物＞

- ①領収証
- ②接種したことがわかる書類（済証、母子健康手帳など）
- ③印鑑
- ④助成金振込先のわかるもの（口座通帳など）



予防接種 Q&A

- Q1 水ぼうそうにかかりました。いつから予防接種できますか？
A1 ウイルス性の病気にかかった場合は、体（免疫の状態）が回復してから接種します。麻疹、風しん、おたふくかぜ、水ぼうそう等にかかった場合は治癒後2～4週間程度、突発性発疹、手足口病、りんご病は1～2週間程度の間隔をあけます。接種時は、医師が状態を判断して可否を決めます。
- Q2 接種日にどうしても保護者が同伴できません。祖父母の同伴でも接種できますか？
A2 予防接種では原則、保護者の同伴が必要です。保護者が特段の理由で同伴できない場合は、お子さんの健康状態を普段からよく知っている親族等の方が同伴することができます。ただし委任状が必要です。事前に保健センターへご連絡ください。
- Q3 風邪を引いて、抗生物質が入った薬を飲んでいました。いつから接種できますか？
A3 抗生物質が体内に残っていたり、体がしっかり回復していなかったりすると、ワクチンの効果が十分に得られないことがあります。飲み終わってから2週間後が目安です。
- Q4 町外のかかりつけ医や里帰り先でも、接種を受けられますか？
A4 岐阜県広域化予防接種事業の協力医療機関であれば、町外の医療機関でも接種を受けられます。協力医療機関一覧や制度の詳細については、岐阜県のホームページをご覧ください。
<http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/kenko/kansensho/11223/kouikika.html>

通知について

予防接種法に基づく定期の予防接種は、市町村が行うことになっており、「広報あんぱち」「いきいきカレンダー」でお知らせしています。予防接種は、住民基本台帳に基づいて行いますので、赤ちゃんが生まれた時、転居した時には、必ず届け出をしましょう。

法律改正等により、予防接種の実施期間や助成金額等が変更になる場合があります。変更になった場合は、広報あんぱち、安八町ホームページ等でお知らせしますので、ご確認ください。

| 問い合わせ | 所長 | 担当 | 電話 | FAX |
|-----------|-----|----|---------|---------|
| 安八町保健センター | 戸之洞 | 牧野 | 64-3775 | 64-5535 |